



Votre
douleur,
parlons-en

Contrat d'engagement

Dans cet établissement,
Nous nous engageons à

Prendre en charge
Votre **douleur**

Vous avez peur d'avoir mal...

Reconnaitre, prévenir, traiter ou soulager votre douleur
c'est **possible**



Environ **1 patient sur 2** utilise un **anesthésique local** avant la séance de dialyse pour soulager la douleur à la ponction.

Le produit est estimé **efficace** dans plus de **90% des cas**.

***Vous souhaitez bénéficier de ce traitement,
parlez-en à l'infirmier ou au néphrologue***

Conseils d'utilisation

Laver le bras de fistule à l'eau et au savon.

Rincer et sécher.

Respecter :

- la dose prescrite
- le temps d'application de **1h30** avant la ponction.

Dès votre arrivée en salle de dialyse

Retirer le(s) pansement(s) d'EMLA®

Essuyer la crème à l'aide de compresses non stériles

Réaliser l'hygiène du bras de fistule avant la ponction.

Le délai maximal d'application ne doit pas dépasser **4 heures** pour éviter les risques d'irritation locale.

Votre participation est essentielle, nous sommes là pour vous écouter, vous soutenir, vous aider

Nous allons vous **aider**

À ne plus avoir mal

ou à avoir moins mal

- En répondant à vos questions ;
- En vous expliquant les soins que nous allons vous faire et leur déroulement ;
- En utilisant le ou les moyens les mieux adaptés.

N'hésitez pas à demander aux soignants de vos centres de dialyse de vous transmettre le **document d'utilisation d'un anesthésique local par le patient hémodialysé**.


L'EMLA est l'anesthésique le plus utilisé, il peut être suppléé par de la cryothérapie appliquée au moment de la ponction par l'infirmier sur prescription médicale.

Enquête satisfaction **2021**



www.sante.gouv.fr

Appréciation de votre Prise en charge de la douleur physique



Article L. 1110-5 du code de la santé publique : « ... toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte ... »